


EESTI HEMOFIILIAÜHING

ÜHING KÕIKIDELE KAASASÜNDINUD VERITSUSHÄIRETELE

Veritsust põhjustab verehüübimiseks vajaliku valgu puudumine


Von Willebrand faktor kannab hüübimisvalgu VIII faktorit vigastuskohta ja seondub vereliistakutega veresoonte seintes. See aitab trombotsütidel kokku puutuda ja moodustada verejooksu peatamiseks trombi. Faktori puudusel on tegu trombotsütaarse veritsusega ehk veritsusega enamasti limaskestadel





Eesti Hemofiiliaühing on hemofiiliahaigete ja teiste verehüübimishäiretega inimeste ning nende perekonnaliikmete vabatahtlik mittetulunduslik üleeestiline ühing.




FVIII hüübimisfaktoril on oluline roll koos FIX faktor FX aktiveerimine ja sellega trombiini ja trombi moodustamine. Valgu puudumisel tromb ei moodusta ja on tegu hemofiilia A-ga, millele on iseloomulik liigesveritsused



F IX hüübimisfaktori puudulikkuse on vähem levinud kui FVIII faktori puudulikkus. Lisaks hemofiilia B-le on tema nimeks ka *Christmas disease*



I faktor, II faktor, V faktor
Fibrinogeeni (FI) puudus või valgu muutus võib olla vastutav nii veritsuse kui trombooside eest. Protrombiin (FII) puudus on samuti vastutav limaskesta veritsuste eest nagu ka FV puudus



FVII hüübimisfaktori mängib samuti olulist rolli verehüübimiskaskaadis, selle puudumisel veritsus on limaskestadel enamasti-väljendudes vererohkete menstruatsioonide või ninaverejooksudena



Eesti Hemofiiliaühing



ehy@hemofiilia.ee



www.hemofiilia.ee